




BROMURO DE ROCURONIO

Bloqueador neuromuscular no despolarizante

PRESENTACIÓN

AM: 50 mg/ 5 ml

INDICACIONES

Coadyuvante de la anestesia para inducir miorelajación del músculo esquelético y facilitar la ventilación mecánica y la intubación traqueal.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a a bloqueante neuromuscular.

SUEROS COMPATIBLES

SF- SG 5% - SRL.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ▲ Mantener refrigerado a 2-8°C
- ▲ Dilución: 0,5 - 2 mg/ml con solventes compatibles.
- ▲ Velocidad: EV directa: 3-5 min. EV infusión continua: 5-15 mcg/kg/min.
- ▲ El bloqueo neuromuscular se potencia con algunos antibióticos
- ▲ Evaluar la relación beneficio-riesgo en pacientes con EPOC, taquicardia, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico y ácido-base.



DOSIS

0,6 - 1,2 mg/kg, luego bolos de 0,1 – 0,2 mg/kg

En infusión continua de 5-15 mcg/kg/min.



REACCIONES ADVERSAS

Hipotensión, broncoespasmo, depresión respiratoria, hipersecreción bronquial, edema, taquicardia, prurito, mareos. Dolor sitio de inyección, Bloqueo inadecuado o prolongado. Puede presentarse parálisis prolongada tras infusiones mayores a las 6 horas.

