



FLUMAZENIL

Antagonista de las benzodiazepinas

PRESENTACIÓN

AM: 0,5 mg/ 5 ml

INDICACIONES

Reversión de la sedación por benzodiazepinas.
Tratamiento específico de la intoxicación por sobredosis de benzodiazepinas.

CONTRAINDICACIONES


Hipersensibilidad al flumazenil. Pacientes que estén recibiendo benzodiazepinas para el control de un estado que implique riesgo vital.

SUEROS COMPATIBLES

SF - SG 5% - SRL

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ▲ Mantener a temperatura ambiente.
- ▲ No requiere dilución.
- ▲ Administración: EV directa: 15 seg.
- ▲ Monitorizar FR, PA, FC, nivel de conciencia, oximetría de pulso.
- ▲ Administración en dosis parciales progresivas.
- ▲ Se pueden presentar síntomas de privación en pacientes con tratamiento prolongado con benzodiazepinas.
- ▲ Se recomienda administrar solo.



DOSIS

Niños > 1 año:

Dosis inicial de 0,01 mg/kg (hasta 0,2 mg). Si es necesario repetir: 0,01 mg/kg a intervalos de 60 seg (hasta un máx de 4 veces) hasta una dosis máx de 0,05 mg/kg o 1 mg.



REACCIONES ADVERSAS

Hipertensión, hipotensión, arritmias, debilidad, bradicardia, taquicardia, extrasístoles ventriculares, sensación de calor, convulsiones, náuseas, vómitos.

