




TAZOBACTAM + PIPERACILINA

Antibacteriano, Asociación de derivado
de penicilina con inhibidor de
betalactamasas

PRESENTACIÓN

FA: Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g

INDICACIONES

Infecciones polimicrobianas severas en que se sospecha presencia de microorganismos aerobios y anaerobios (intraabdominal, piel y estructura cutánea, tracto respiratorio superior e inferior, ginecología). Infecciones neutropénicas febriles en pacientes pediátricos en combinación con un aminoglucósido, infecciones intra - abdominales en niños de 2 años o mayores.

CONTRAINDICACIONES


Hipersensibilidad a penicilinas o inhibidores de betalactámicos.

SUEROS COMPATIBLES

SF- SG 5%- API.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ▲ Mantener a temperatura ambiente
- ▲ Reconstitución: 20 ml de solvente.
- ▲ Dilución: 20 mg/ml– 200 mg/ml.
- ▲ Administración:
 - EV directa: lento en 3 - 5 min.
 - EV infusión intermitente: lento en 20 - 30 min.
 - EV infusión continua: infundir por 3 a 24 horas.
- ▲ El uso prolongado puede provocar sobreinfección, colitis pseudomembranosa, alteración en la coagulación.



DOSIS

Usual: 80 - 100 mg/Kg/día
divididos en dosis cada 6 horas.

En infecciones severas:
240 - 400 mg/Kg/día divididos en
dosis cada 6 horas.

En pacientes sobre 50 Kg usar dosis
de adultos.



REACCIONES ADVERSAS

Diarrea, constipación, náuseas, vómitos, insomnio, cefalea, rash, dispepsia, leucopenia, trombocitopenia, hipertensión, hipotensión, edema, agitación, confusión, broncoespasmo, hipocalcemia, eosinofilia. Observar signos de anafilaxis durante los primeros minutos tras la administración.

