



# DROPERIDOL

Neuroepiléptico, Antiémético

## PRESENTACIÓN

AM: 5mg/2 ml

## INDICACIONES

Premedicación anestésica como neuroepiléptico, en neuroleptoanalgesia asociado a fentanyl.

## CONTRAINDICACIONES


Hipersensibilidad al fármaco.

## SUEROS COMPATIBLES

SF

## CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ▲ Mantener a temperatura ambiente
- ▲ Dilución: 0,2 mg/ ml
- ▲ Administración:  
EV directa: administra en 5 minutos, diluido en 20 cc de suero  
EV infusión intermitente: diluir una ampolla en 250 cc de suero, pasar en 2 a 3 horas.
- ▲ Se debe tener especial precaución en su uso concomitante con fármacos depresores del sistema nervioso central, porque puede potenciar su efecto.



## DOSIS

**Profilaxis y tratamiento de las náuseas y vómitos postoperatorios:**

>2 años: 10- 50 mcg/kg (dosis máxima: 1,25 mg). Administrar la primera dosis 30 minutos antes del final de la cirugía, repetir cada 6 horas si fuese necesario.



## REACCIONES ADVERSAS

No hay datos en niños, se describen las descritas en la población adulta: prolongación del intervalo QT , hipotensión, taquicardia, ansiedad, síntomas extrapiramidales, distonía, signos y síntomas pseudoparkinsonianos, alteraciones centrales en la regulación de la temperatura, sedación, náuseas, vómitos.

