



DEXMEDETOMIDINA

Sedante, Analgésico.

PRESENTACIÓN

AM: 100 mcg/ml - MTZ: 400 mcg/100 ml

INDICACIONES

Proporciona sedación y analgesia, sin depresión respiratoria.

CONTRAINDICACIONES

Inestabilidad hemodinámica, bloqueo AV de primer o segundo grado, bradicardia <50 lat/min, hipotensión, enfermedad cerebrovascular grave, o hipersensibilidad al fármaco.

SUEROS COMPATIBLES

SF- SG 5%- SRL

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ▲ Mantener a temperatura ambiente.
- ▲ Dilución: 4 mcg/ml
- ▲ Velocidad: EV directa: Infusiones muy rápidas pueden provocar bradicardia y arresto sinusal. EV infusión continua: La dosis de mantención es de 0,2- 0,9 mcg/kg/h.
- ▲ Administrar en bolo programadas.
- ▲ Se recomienda monitoreo electrocardiográfico (ECG) durante la administración.



DOSIS

Administrar dosis de carga: 0,5-1 mcg/kg en 10 minutos seguido de una infusión de mantención de 0,2-0,7 mcg/kg/h (promedio 0,29 mcg/kg/h).

Las dosis máxima de mantención utilizadas han sido 0,75 mcg/kg/h y 1 mcg/kg/h.



REACCIONES ADVERSAS

Hipotensión y bradicardia, náuseas, dolor, fiebre, agitación, mareos.

