



FENOBARBITAL

Barbitúrico, Anticonvulsivante, Hipnótico

PRESENTACIÓN

AM: 200 mg/1 ml

INDICACIONES

Hiperexcitabilidad psicomotriz. Anticonvulsivante preventivo de crisis epilépticas. Hiperbilirrubinemia y kernicterus en el recién nacido.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al fármaco.
Disfunción hepática y respiratoria importante.
Porfiria.

SUEROS COMPATIBLES

SF - SG 5%

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ▲ Mantener a temperatura ambiente y protegido de la luz.
- ▲ Dilución: 10 mg/ ml
- ▲ Administrar en 3-5 min, no exceder de 1 mg/kg/min; no sobrepasar de 30 mg/min en niños < 60 kg, o de 60 mg/min en niños con peso de 60 kg o más.
- ▲ Observar función respiratoria y posibilidad de asegurar vía aérea por depresión respiratoria.
- ▲ Evitar la extravasación perivascular y la administración intraarterial debido a la alcalinidad de la solución.



DOSIS

Dosis de carga de 15-20 mg/kg (dosis máx. 1 g, puede repetirse la dosis después de 15 min).

Dosis de mantención 3-8 mg/kg/día en 1-2 dosis diarias.



REACCIONES ADVERSAS

Hipotensión, arritmias, bradicardia, tromboflebitis, espasmo arterial, letargo, náuseas, vómitos, rash, oliguria, laringoespasmo, apnea, depresión respiratoria, hipotermia, excitación del SNC.

