




DANTROLENO

Relajante muscular.

PRESENTACIÓN

FAL: 20 mg

INDICACIONES

Tratamiento de la hipertermia maligna.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al fármaco. Disfunción hepática severa.

SUEROS COMPATIBLES

API.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ▲ Mantener a temperatura ambiente.
- ▲ Reconstitución: El vial debe reconstituirse con 60 ml de API. La concentración final es de 0,333 mg/ml.
- ▲ Dilución: No requiere
- ▲ Velocidad: EV directa: Mínimo en 3 min. EV infusión intermitente: mínimo en 1 hr.
- ▲ Dantroleno es considerado un fármaco hepatotóxico, es importante vigilar la función hepática.
- ▲ La extravasación es muy irritante para los tejidos debido al alto pH.



DOSIS

Tratamiento de la hipertermia maligna:

Inicial: 1 mg/kg

Luego: 1 - 2,5 mg/kg repetir cada 6 horas.

Si los síntomas persisten se administran dosis sucesivas de igual valor, hasta llegar a un máximo acumulativo de 10 mg/kg.



REACCIONES ADVERSAS

Diarrea, náuseas, hepatitis, mialgia, rash, somnolencia, confusión, disturbios visuales.

