




TEICOPLANINA

Antibacteriano. Glicopéptido

PRESENTACIÓN

FA: 200 mg / FA: 400 mg

INDICACIONES

Indicado en el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos gram - positivo susceptibles, incluyendo aquellos que son resistentes a otros antibióticos. Endocarditis, septicemia, infecciones osteoarticulares, infecciones respiratorias, infecciones de la piel y de los tejidos blandos, infecciones del aparato urinario y peritonitis asociados con diálisis peritoneal crónica ambulatoria.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a teicoplanina o a glicopéptidos.

SUEROS COMPATIBLES

SF- SG 5%.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ▲ Mantener a temperatura ambiente
- ▲ Reconstitución: Utilizar 3 ml de solvente.
- ▲ Dilución: 2 - 10 mg/ml. Máx 16 mg/ml
- ▲ Administración:
EV directa: lento en 3 - 5 min.
EV infusión intermitente: lento 20 - 30 min.
- ▲ En menores de 2 meses se debe usar solo la infusión intermitente endovenosa de 30 minutos.



DOSIS

Infecciones severas y niños neutropénicos: 10 mg/kg cada 12 horas las 3 primeras dosis; con dosis máxima de 400 mg/día.

Infecciones moderadas: 10 mg/kg cada 12 horas las 3 primeras dosis; a continuación se administrará una sola dosis de 6 mg/kg/día.



REACCIONES ADVERSAS

Se puede observar eritema, dolor local, tromboflebitis, rash, prurito, fiebre, broncospasmo, reacciones de anafilaxia, náusea, vómitos, diarrea, eosinofilia, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, trombocitosis, mareos, cefaleas, pérdida transitoria de la audición, tinnitus.

