



ERGOMETRINA MALEATO

Oxitócico

PRESENTACIÓN

AM: 0,2 mg/ml

INDICACIONES

Tratamiento de atonía o hemorragia uterina.
Prevención y tratamiento de las hemorragias postparto.

CONTRAINDICACIONES


Hipersensibilidad al fármaco, en la inducción del trabajo de parto, hipertensión, insuficiencia renal o hepática, en pacientes con deficiencia de calcio, en sepsis, y durante la lactancia.

SUEROS COMPATIBLES

SF.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ▲ Mantener refrigerado entre 2 y 8°C
- ▲ Diluir la dosis en 5 ml de SF.
- ▲ Administración:
EV directa: En los casos urgentes, se puede administrar 0,2 mg vía IV lento.
IM: 0,2 mg, repetir hasta 5 veces, según necesidad cada 2- 4 horas.
- ▲ La administración EV rápida causa hipertensión.



DOSIS

Dosis usual para adultos:

Estimulante uterino: vía EV lenta o IM, 200 mcg, repetidas a las 2 ó 4 horas, si fuera necesario, hasta 5 dosis.



REACCIONES ADVERSAS

Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, cefalea, vértigo, dolor torácico, palpitaciones, bradicardia y otras arritmias cardíacas, infarto al miocardio, disnea y edema pulmonar.

