




METILPREDNISOLONA

Glucocorticoide, Antiinflamatorio
esteroidal, Inmunosupresor

PRESENTACIÓN

FAL: 40 mg, 125 mg, 500 mg

INDICACIONES

Tratamiento de shock, insuficiencia adrenocortical, alergia, asma, dermatitis por contacto, urticaria, picaduras de insecto y en condiciones donde se requiere inmunosupresión.

CONTRAINDICACIONES


Hipersensibilidad al fármaco.

SUEROS COMPATIBLES

SF- SG 5%

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ▲ Mantener a temperatura ambiente y protegido de la luz.
- ▲ Reconstitución: 5 cc API
- ▲ Dilución:
Máx concentración en bolo: 125 mg/ml.
Máx concentración en infusión: 2,5 mg/ml.
- ▲ Administración: EV directa e infusión intermitente.
La velocidad de administración depende de la dosis, 3min hasta 1 hora.
- ▲ Monitorizar presión arterial, glucosa en sangre y electrolitos.



DOSIS

0.5 a 2 mg/kg/dosis c/8 hrs.

Inmunosupresión:
5 - 10 mg/kg/día.



REACCIONES ADVERSAS

Edema, hipertensión, vértigo, psicosis, acné, intolerancia a la glucosa, hipokalemia, alcalosis, úlcera péptica, náuseas, vómito, espasmo muscular, catarata, glaucoma, síndrome de Cushing. No administrar dosis elevadas en bolo, puede producir arritmias, hipotensión severa y paros cardiacos.

