



VANCOMICINA

Antibacteriano, Glicopéptido.

PRESENTACIÓN

FA: 500 mg, 1000 mg

INDICACIONES

Infecciones estafilocócicas, meticilino resistentes, endocarditis infecciosa, infección ósea, meningitis bacteriana, bacteremia, infecciones respiratorias, de piel y tejidos blandos, endocarditis, colitis pseudomembranosa.

CONTRAINDICACIONES


Hipersensibilidad a teicoplanina o a glicopéptidos.

SUEROS COMPATIBLES

SF- SG 5%.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ▲ Mantener a temperatura ambiente
- ▲ Reconstitución: Reconstituir el FA de 500 mg con 10 ml.
- ▲ Dilución: Rango usual 2,5 - 5 mg/ml.
- ▲ Administración:
EV infusión intermitente: 60 min.
EV infusión continua: 3 horas.
En ambos esquemas no exceder de 10 mg/min.
- ▲ Precaución en pacientes con insuficiencia renal, y en el uso concomitante con otros antibióticos nefrotóxicos y ototóxicos



DOSIS

Infecciones moderadas:
40 mg/kg/día cada 6 horas.

Infecciones severas:
60 mg/kg/día cada 6 horas.



REACCIONES ADVERSAS

Nefrotoxicidad, ototoxicidad, en infusión iv rápida taquicardia, prurito, hipotensión, eritema sobre todo en la parte superior del cuerpo, neutropenia, eosinofilia, flebitis, dolor de espalda, fiebre, escalofríos, muy irritante para los tejidos.

